



درباره



دارو درمانی

در بیماری های روان
پزشکی بیشتر بدانید

اگر روانپژشک برای شما یا یکی از نزدیکان شما دارو تجویز کرده است، لازم است نکات زیر را بدانید:

- اثر درمانی بعضی از داروها بعد از چند روز تا چند هفته مشخص می شود. بنابراین اگر با شروع مصرف دارو بلا فاصله بهبودی نداشتید، دارو را قطع نکنید.
- از قطع خودسرانه و تغییر مقدار و نوع داروها پرهیز کنید. با بهبودی نشانه های بیماری دارو را قطع نکنید چون ممکن است بیماری عود کند. دوره درمان را روانپژشک بسته به نوع بیماری شما تعیین می کند.

در اغلب بیماری های روان پزشکی، داروهای اصلی ترین و مؤثر ترین روش درمان هستند و در جلوگیری از عود و بازگشت بیماری نقش مهمی دارند. مشکلات مربوط به سلامت روان، بسیار شایع هستند. ممکن است هر کسی نوعی از بیماری را در دوره ای از زندگی خود تجربه کند و نیاز به درمان داشته باشد.



اعتداد آور نیستند

اعتداد آور نیستند

- بعضی افراد به اشتباه عقیده دارند که داروهای گیاهی کم عارضه تر هستند و می‌توانند به جای داروهای تجویز شده توسط پزشک استفاده شوند. داروهای گیاهی برای درمان اکثر بیماری‌ها مؤثر نیستند و حتی ممکن است استفاده همزمان داروهای گیاهی با سایر داروهای شما باعث عوارض بشود.

- عارض دارو که در بروشور داروها نوشته شده است در تمام افراد ایجاد نمی‌شود. اگر با مصرف دارو مشکلی پیدا کردید که فکر کردید عارضه دارو است با روان‌پزشک معالج خود مشورت کنید. اکثر عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها، گذرا یا خفیف است.

- گاهی پزشک برای برطرف کردن عارضه دارویی میزان دارو را تغییر می‌دهد، یا داروی دیگری تجویز می‌کند، یا داروی شما را تغییر می‌دهد.

- اگر برای مشکل دیگری به پزشک مراجعه کردید، نام داروهای خود را به پزشک اطلاع دهید تا از تداخل داروها باهم پیشگیری شود. همین‌طور روان‌پزشک را از مصرف سایر داروهای مطلع کنید.

- درمان با اغلب داروهای روان‌پزشکی وابستگی یا اعتیاد ایجاد نمی‌کند. در صورتی که دارویی برای شما تجویز شود که باعث عادت و وابستگی بشود روان‌پزشک آن‌ها را در اسرع وقت قطع می‌کند.