




کلوزاپین

کلوزاپین

- برای شروع کلوزاپین لازم است، بیمار آزمایش خون انجام دهد و در زمان مصرف دارو هم به طور منظم و دوره‌ای آزمایش خون انجام می‌شود.
- برای کم کردن عوارض، دارو به تدریج اضافه می‌شود تا به اندازه مناسب و مؤثر برای درمان بیماری برسد. مانند بسیاری از داروها اثر کامل دارو چند هفته بعد از شروع آن ظاهر می‌شود؛ بنابراین دارو را بدون نظر پزشک قطع نکنید.
- از مصرف الکل در زمان مصرف دارو پرهیز کنید.
- اگر از داروهای دیگری استفاده می‌کنید به روان‌پزشک خود اطلاع بدهید و در زمان مراجعه به پزشکان دیگر نیز به آن‌ها بگویید که کلوزاپین مصرف می‌کنید.
- اگر کلوزاپین مصرف می‌کنید برای بارداری یا شیردهی با پزشک مشورت کنید.
- اگر یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف کنید. اگر نوبت بعدی مصرف دارو نزدیک است نیازی به مصرف نوبت فراموش شده نیست.

کلوزاپین دارویی است که معمولاً در درمان بیماری اسکیزوفرنی استفاده می‌شود. کلوزاپین ممکن است برای بیماری‌های دیگر روان‌پزشکی نیز تجویز شود. این دارو معمولاً در مواقعی که بیمار به سایر داروها پاسخ درمانی مناسبی نداده است تجویز می‌شود. کلوزاپین یکی از مؤثرترین داروها برای کنترل بیماری اسکیزوفرنی است. اگر برای شما یا یکی از اعضای خانواده شما، کلوزاپین تجویز شده لازم است نکاتی را در مورد این دارو بدانید.



خواب آلودگی ناشی از دارو:
در هفته های اول بیشتر است



آزمایش خون

یکی از عوارض جدی کلوزاپین، کاهش گلبولهای سفید خون است که خوشبختانه شایع نیست و در موارد بسیار کمی پیش می آید. برای پیشگیری از این مشکل روانپزشک دارو را به تدریج افزایش می دهد و از شما می خواهد که چند هفته یک بار آزمایش خون بدهید. در صورتیکه تب، گلودرد، یا زخم در جایی از بدن داشتید لازم است کلوزاپین را قطع کرده و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی کلوزاپین

کلوزاپین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی، ممکن است عوارضی داشته باشد. روانپزشک، زمانی این دارو را تجویز می کند که فایده آن بیشتر از عوارض باشد. عوارض دارو در تمامی افراد، ظاهر نمی شود. عوارض دارو اغلب خوش خیم و موقتی هستند. بسیاری از عوارض دارویی، قابل درمان هستند. در صورت مشاهده عوارض، دارو را قطع نکنید ولی در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید. پزشک به شما راهنمایی می کند و ممکن است دارویی برای برطرف کردن عوارض تجویز کند.

خواب آلودگی، بیوست، افزایش وزن، آبریزش از دهان، احساس سبکی سر یا سیاهی رفتن چشم از عوارض شایع کلوزاپین هستند. اکثر این عوارض بعد از مدتی با عادت کردن بدن شما به دارو، خودبه خود برطرف می شوند.

خواب آلودگی ناشی از دارو، معمولاً در هفته های اول بیشتر است و بعد از مدتی کمتر می شود. می توانید با نظر پزشک بیشتر دارو را شب استفاده کنید که روزها کمتر خواب آلود شوید. برای کم کردن بیوست، سبزیجات و میوه بیشتری استفاده کنید. برای پیشگیری از چاقی و بیوست سعی کنید ورزش کنید و تحرک بیشتری داشته باشید.

مرکز سلامت روان و توانبخشی
بیمارستان روزبه (مسرت)
مرکز روزانه



انجمن علمی
روان پزشکان ایران

