



متادون



قلبی شود. افرادی که متادون مصرف می کنند، بدنشان بر اساس دریافت منظم این دارو تنظیم می شود و اگر به طور ناگهانی مصرف آن را قطع کنند، علائم ترک (خماری) را تجربه می کنند و به همین دلیل ادامه مصرف زیر نظر پزشک ضرورت دارد. تغییر خودسرانه میزان مصرف می تواند منجر به عوارض جانبی خطرناک و یا برای جبران آن مصرف بیش از حد شود. علائم مصرف بیش از حد عبارتند از: تنفس آهسته، ضربان قلب آهسته، خواب آلودگی شدید، ضعف عضلات، پوست سرد و کاهش سطح هوشیاری. به خاطر داشته باشید که مصرف بیش از حد می تواند کشنده باشد. مهم است که در مورد استفاده از متادون با پزشک خود صادق باشید.

با توجه به این که در اغلب موارد اختلال مصرف مواد و رفتارهای اعتیادی برای سالهای طولانی در فرد مصرف کننده وجود دارند، برای درمان وابستگی، لازم است متادون مورد نیاز طبق تجویز پزشک به صورت طولانی مدت (عموماً بیش از یک سال) استفاده شود. زمانی که نیاز به توقف مصرف متادون باشد، می بایستی این کار زیر نظر پزشک انجام شود تا از عوارض ناخواسته و عود پیشگیری شود.

عوارض جانبی متادون:

مانند تمام داروهای افیونی، متادون هم می تواند باعث بروز مشکلاتی در بدن از جمله مشکلات تنفسی، مشکلات کبدی، یبوست و مشکلات

وابستگی به مواد افیونی استفاده می شود. مصرف متادون، تنها بخشی از برنامه درمانی شمامست و تنها درمان نیست.

روش مصرف متادون:

متادون باید بر اساس برنامه درمانی توصیه شده توسط پزشک معالج مصرف شود. دارو به شکل قرص و شربت موجود است و در طول دوره درمان ممکن است میزان تجویزی متادون تغییر کند. بهتر است در طول دوره مصرف، پزشک را در جریان حالات و شرایط خود قرار دهید و هیچ گاه خودسرانه مصرف متادون را قطع نکنید.

متادون چگونه عمل می کند؟

بدن انسان برای تنظیم درد، به مقادیر بسیار اندک مورفین نیاز دارد. متادون با تاثیر بر گیرنده های مورفین داخل بدن، نحوه واکنش مغز و سیستم عصبی شما به درد را تغییر می دهد؛ بنابراین احساس درد کمتری خواهید داشت. در عین حال، میزان احساس سرخوشی و شادی ناشی از آن به مراتب کمتر از مواد افیونی همچون کدئین، هروئین، و تریاک است.

متادون می تواند علائم ترک (خماری) و ولع و وسوسه مصرف را در فرد کنترل نموده و به همین دلیل به عنوان یکی از درمان های جایگزین

متادون چیست؟

متادون یک داروی قوی بوده که به عنوان ضد دردهای افیونی طبقه بندی می شود. در ابتدا، پزشکان از آن تنها برای درمان افرادی که درد شدید داشتند استفاده می کردند؛ اما امروزه، به عنوان بخشی از برنامه درمان جایگزین برای وابستگی به مواد مخدر استفاده می شود. با وجودیکه متادون از سایر داروهای مخدر ایمن تر است، مصرف آن بدون نظر پزشک می تواند منجر به اختلال مصرف و وابستگی شود.